



Ihre Katze kommt nach einem Klinikaufenthalt wieder nach Hause



„Gold Standard“
zertifiziert
seit 2017



Ihre Katze braucht jetzt besondere Zuneigung

Wieder zu Hause

Nach einem Klinikaufenthalt müssen Sie für die weitere Genesung Ihrer Katze einige Dinge beachten:

- Wenn Ihre Katze am Tag der Abholung in Narkose war, ist sie möglicherweise noch etwas gedämpft und unsicher auf den Beinen. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge
- Katzen können aufgeregt oder desorientiert sein – reden Sie leise mit Ihrem Tier und streicheln Sie es behutsam. Lassen Sie Ihre Katze selbst den ersten engeren Kontakt zu Ihnen suchen, wenn sie bereit dazu ist
- Versuchen Sie, das Lecken an Wunden oder Nähten zu verhindern. Ihr/e Tierarzt/ärztin hat ihnen dazu einen Body oder Halskragen mitgegeben. Diese sollen möglichst immer getragen werden, vor allem, wenn die Katze unbeaufsichtigt ist. Nach einer Gewöhnungsphase klappt in der Regel sogar das Fressen mit Halskragen. Im Zweifel nehmen Sie hierfür den Kragen unter Beaufsichtigung kurz ab. In der Gewöhnungsphase kann es vorkommen, dass Ihre Katze mit dem Kragen anstößt, rückwärts läuft oder versucht ihn abzustreifen
- Geben Sie unbedingt alle verordneten Medikamente
- Schmerz kann bei Katzen mitunter schwer zu erkennen sein. Reduzierter Appetit und Rückzugsverhalten können Anzeichen hiervon sein. Kontaktieren Sie die Klinik, wenn sie beunruhigt sind
- In einigen Fällen werden Sie Ihre Katze für eine bestimmte Zeit im Haus oder auch in einem Raum oder einer Box ruhig halten müssen
- Stellen Sie einen ruhigen, warmen Bereich im Haus zur Verfügung, wo Ihre Katze sich in Ruhe erholen kann



Nach einer Gewöhnungsphase akzeptieren Katzen den Kragen in der Regel problemlos



Partnerkatzen müssen sich nach der Trennung erst langsam wieder aneinander gewöhnen



Zusammenführung mit Partnerkatzen

Ihre Katze kann, insbesondere während eines längeren stationären Aufenthalts in der Tierklinik, fremde, ungewohnte Gerüche angenommen haben. Diese Gerüche können Partnerkatzen zu Hause verunsichern. Daher sollten Ihre Katzen sehr behutsam wieder zusammengeführt werden:

- Lassen Sie die Tiere bei der Zusammenführung nicht aus den Augen
- Überhäufen Sie die zurückkehrende Katze nicht mit Aufmerksamkeit von Familienmitgliedern oder weiteren Haustieren
- Lassen Sie Ihre Katze vor der Zusammenführung erst den hauseigenen Geruch wieder annehmen. Dafür halten Sie, falls nötig, Ihre Katzen für 1-2 Tage getrennt und erlauben nur schrittweise Kontakt
- Waschen Sie alle Decken oder Handtücher, die in der Tierklinik waren, um fremde Gerüche zu entfernen
- Mischen Sie die spezifischen Düfte Ihrer Katzen – streicheln Sie sie abwechselnd, insbesondere am Kopf, und vertauschen Sie die Decken/Körbe der Katzen mehrfach
- Die Lieblingsruheplätze Ihrer Katzen können unterstützend mit „Feliway®“ (der Nachbildung des natürlichen Katzen-Pheromons) eingesprüht werden

Fütterung Ihrer Katze

Nach einem stationären Aufenthalt oder einer Operation kann es vorkommen, dass Ihre Katze nur zögernd und widerwillig zu fressen beginnt. Um sie zum Fressen zu animieren, können Sie folgendes versuchen:

- Erwärmen Sie Feuchtfutter auf Körpertemperatur
- Bieten Sie geschmackvolles Futter an, wie z.B. Welpenfutter für Katzen
- Eventuell haben Sie von der Tierklinik spezielle Futterempfehlungen zur Unterstützung der Rekonvaleszenz und Organfunktion erhalten. Stellen Sie das Futter aber nur schrittweise um
- Versuchen Sie Ihre Katze mit der Hand zu füttern und streicheln Sie sie dabei
- Streichen Sie eine kleine Menge Futter auf eine Pfote der Katze – einige Tiere beginnen, es abzulecken
- Benutzen Sie flache Futterschalen um zu vermeiden, dass die empfindlichen Schnurrhaare den Schüsselrand berühren
- Kontaktieren Sie die Tierklinik, wenn Ihre Katze nicht innerhalb von 1-2 Tagen zu fressen beginnt



Breite, flache Futterschüsseln schützen die empfindlichen Schnurrhaare



Probieren Sie beim Füttern Alternativen aus

Bitte denken Sie immer daran:

Wenn Sie aus irgendeinem Grund beunruhigt sind, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!